



Ficha técnica

Foliveex Polisacáridos®

Foliveex Polisacáridos® es un biofertilizante formulado con reservas energéticas que activan el metabolismo vegetal y son asimiladas de forma inmediata por la planta. Su alto contenido de potasio favorece el metabolismo de carbohidratos, la síntesis de proteínas y el transporte de almidón, mientras que el aporte de boro mejora la producción y calidad de flores y frutos. Enriquecido con aminoácidos libres, ácidos fúlvicos y vitamina B1, Foliveex Polisacáridos® ayuda a superar situaciones de estrés, promueve la absorción de nutrientes y potencia los procesos fisiológicos, logrando cultivos más productivos y de mejor calidad.

Composición química

	p/p
Nitrógeno (N)	6.50%
Potasio (K ₂ O)	23.00%
Boro (B)	2.00%
Polisacáridos	35.00%
Magnesio (MgO)	5.00 ppm
Manganeso (Mn)	7.50 ppm
Hierro (Fe)	10.00 ppm
Zinc (Zn)	10.00 ppm
Azufre (S)	5.00 ppm
Vitamina B1	10.00 ppm
L-Aminoácidos libres	0.10%
Ácidos fúlvicos	0.10%

Presentación:

1 kg
1.5 kg
25 kg

Ventajas principales:

- Disponibilidad inmediata de energía metabolizable.
- Corrige deficiencias energéticas en condiciones de estrés climático (altas temperaturas, exceso de luz o bajas temperaturas con poca luminosidad).
- Estimula la floración, fructificación y maduración.
- Mejora la absorción y aprovechamiento de nutrientes.

Preparación de la mezcla:

Se recomienda llenar el tanque a la mitad de su capacidad para luego agregar la dosis recomendada de Foliveex Polisacáridos® y agitar lo suficiente para que se disuelva completamente. Por último termine de llenar el tanque.

Forma de aplicación:

Se puede aplicar por vía foliar, fertirrigación, inyección al suelo y por vía aérea.

Recomendaciones de uso:

Se recomienda usarlo durante todo el ciclo del cultivo, comprendido desde el trasplante (o a los 20 días de nacido en siembra directa) hasta su madurez. En forma general se debe aplicar cada 15 días.



Ficha técnica

Foliveex Polisacáridos®

Método de aplicación y dosis:

Cultivo	Dosis
Hortalizas en general Crucíferas	1.75 kg/200 L de agua 20 días después del trasplante o siembra directa. Repetir cada 15 días.
Cucurbitáceas	5-7 kg/ha en el agua de fertirriego 20 días después del trasplante. Repetir cada 15 días.
Banano	1-1.5 kg/200 L de agua
Aguacate Café Frutales	En el almácigo 20 días después de la siembra. En café 10 días después de la poda de raíz en dosis de 1.75 kg/200 L de agua.
Caña de azúcar Pastos	De 5-7 kg/ha. En caña de azúcar usar una dosis de 1.5- 2 kg/ha para sacar de intoxicaciones por efecto de los herbicidas en el cultivo.
Arroz	7 kg/ha a la siembra y 25 días después.
Piña	7 kg/ha a los 22 y 50 días después de la siembra.
Raíces y tubérculos	4 kg/200 L de agua 22 días después de la siembra.
Plantas ornamentales	2-3 g/L de agua en fertirriego o dirigido a la base de la planta. En siembra directa al suelo 5 kg/ha en fertirrigación.