



Ficha técnica

Foliveex® Zinc Boro

Composición química	p/p
Zinc (Zn)	8.5%
Boro (B)	8.5%
Azufre (S)	4.1%
Ácidos Fúlvicos	1.5%
Inertes	77.40%
TOTAL	100%

Contenido neto:
500 g

SERACSA
SALUD PARA SUS CULTIVOS

Composición química

	p/v
Zinc (Zn)	8.50%
Boro (B)	8.50%
Azufre (S)	4.10%
Ácidos fúlvicos	1.50%

Presentación:

500 g
1 kg
5 kg
20 kg

Foliveex® Zinc 8.5% + Boro 8.5% es un fertilizante foliar formulado para suplir de manera eficiente los requerimientos nutricionales de zinc, boro y azufre en las plantas. Promueve procesos esenciales como la división celular y el transporte de azúcares y almidones (reservas) dentro de la planta. Ambos elementos estimulan el crecimiento celular en tejidos nuevos o jóvenes, mejoran el peso, tamaño y forma de los frutos, y favorecen la formación de granos y semillas.

En café, la fertilización foliar se ha utilizado tradicionalmente para suplir zinc y boro, elementos que suelen ser deficitarios tanto en este cultivo como en la mayoría de los frutales (banano, plátano, cítricos, hortalizas, entre otros). De hecho, el zinc y el boro son los micronutrientes cuya deficiencia se presenta con mayor frecuencia en los suelos y cultivos del país, lo que resalta la importancia de incorporarlos vía foliar en las distintas etapas fenológicas.

La aplicación de Foliveex® Zinc 8.5% + Boro 8.5% favorece una mayor floración y mejora el cuajado al momento de la apertura floral. En café, aplicado después de las primeras lluvias, estimula el crecimiento de hojas en las bandolas, fortaleciendo el desarrollo del cultivo.

Preparación de la mezcla:

Se recomienda llenar el tanque a la mitad de su capacidad para luego agregar la dosis recomendada de Foliveex® Zinc 8.5% + Boro 8.5% y agitar lo suficiente para que se disuelva completamente. Por último termine de llenar el tanque.

Método de aplicación y dosis:

Aplique una dosis de 0.5-1 L/200 L de agua. Aplicar de acuerdo a las necesidades nutricionales y al estado fisiológico en el que se encuentre la planta. Para el cultivo de piña, la dosis recomendada son 3 L/ha en etapas tempranas y 5 L/ha en etapas finales.