



Ficha técnica

Fulmic® 0-30-25

Fulmic® 0-30-25 induce la producción de fitoalexinas, compuestos que forman parte de los mecanismos naturales de defensa de las plantas frente a enfermedades como *Phytophthora* y mildiu. Puede aplicarse durante todo el ciclo del cultivo, se absorbe fácilmente y es apto tanto para aplicaciones foliares como en sistemas de fertirriego.

Método de aplicación y dosis:

Cultivo	Dosis	Recomendaciones de uso
Piña	10-12 L/ha	Realice aplicaciones foliares cada 15 días durante el ciclo del cultivo. Volumen total de mezcla de 2000 L.
Papa, tomate, chile, cebolla, repollo y hortalizas en general	0.5-1L/200 L de agua	Inicie las aplicaciones foliares después del trasplante y luego cada 7-15 días o de acuerdo a las necesidades del cultivo.
Melón, sandia, pepino	1-2 L/ha	Aplique cada 7-15 días o de acuerdo a las necesidades del cultivo.
Banano, plátano, aguacate, cítricos, frutales	0.5-4 L/ha	Realice aplicaciones periódicas de acuerdo al estadio de la plantación y época del año.
Ornamentales y flores	0.5 L/ha	Aplique cada 15-22 días o de acuerdo a las necesidades del cultivo.

Aplicación directa a los árboles: En frutales, cítricos o aguacates debilitados o dañados, se recomienda aplicar Fulmic® 0-30-25 directamente sobre las zonas afectadas, utilizando una solución de 500 ml/L de agua y aplicándola con brocha. Se aconseja realizar de 2-3 tratamientos al año. Además, es conveniente mojar el cuello, el tronco y las ramas principales del árbol para obtener mejores resultados.

Composición química

Fósforo (P₂O₅)

Potasio (K₂O)

p/v

30.00%

25.00%

Presentación:

1 Litro

3.5 Litros

5 Litros

9.5 Litros

19 Litros

20 Litros

