

VENTA RESTRINGIDA BAJO RECETA PROFESIONAL

¡ALTO! LEA EL PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO Y CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRÍCOLAS.



SUNXAMYL 24 SL

INSECTICIDA - NEMATICIDA - CARBAMATO
OXAMYL



TÓXICO

ANTÍDOTO: SULFATO DE ATROPINA

DENSIDAD: 0,921 g/ml 25°C

ESTE PRODUCTO PUEDE SER MORTAL SI SE INGIERE Y/O SE INHALA
PUEDE CAUSAR DAÑOS A LOS OJOS Y A LA PIEL POR EXPOSICIÓN

NO ALMACENAR EN CASAS DE HABITACIÓN, MANTÉNGASE ALEJADO DE LOS NIÑOS, PERSONAS MENTALMENTE INCAPACES, ANIMALES DOMÉSTICOS, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS

USO AGRONÓMICO

MODO DE ACCIÓN: SUNXAMYL 24 SL es un insecticida, nematocida sistémico y de contacto para uso agrícola, cuando se aplica al suelo y al follaje para el control de nemátodos, para los insectos, actúa por contacto; con efecto moderado residual. No es volátil.

EQUIPO DE APLICACIÓN: SUNXAMYL 24 SL puede aplicarse con su equipo de aspersión especializado de pistola Spot-Gun utilizando boquillas de cono sólido cuando sea banano o plátano. Con un volumen de caldo de hasta 400 litros/ha. También con equipos de aspersión aéreos y terrestres utilizando boquillas para insecticidas. El personal que manipule este producto deberá usar equipo de protección personal: Botas de hule, mascarilla, anteojos, guantes de hule, dosificador y aplicador. Calibre correctamente su equipo de aplicación inicialmente solo con agua. Verifique que el mismo se encuentre en buen estado de funcionamiento y sin fugas. Este producto no es corrosivo ni inflamable.

FORMA DE PREPARACIÓN DE LA MEZCLA:

Antes de manipular el SUNXAMYL 24 SL debe usar el equipo de protección personal, como con todos los productos químicos, evite el contacto con la solución. No se debe comer, o fumar durante el manejo y la aplicación de este producto.

De acuerdo con la dosis de SUNXAMYL 24 SL a utilizar, llene el tanque hasta la mitad con agua limpia, agregue la dosis del producto poniendo el sistema de agitación o recirculación a funcionar, termine de llenar con agua limpia, agite hasta obtener una mezcla homogénea antes de comenzar la aspersión.

RECOMENDACIONES DE USO: Costa Rica

El producto es un insecticida nematocida, perteneciente al grupo de los carbamatos puede usarse como tratamiento al suelo o a la siembra o para pequeñas superficies, como invernaderos. Tratamientos para inmersión de bulbos, tallos y raíces. También puede utilizarse en aplicaciones foliares, solo o como complemento al tratamiento de suelo. Para aplicar el producto deben existir condiciones de humedad para asegurar el movimiento del producto en el suelo a las áreas de crecimiento de las raíces. Se recomienda su rotación con nematocidas de grupo químico diferente.

CULTIVO	PLAGA	DOSIS /ha	INTERVALO ENTRE APLICACIÓN Y COSECHA (DÍAS)
Pepino <i>Cucumis sativus</i> Melón <i>Cucumis melo</i> Tomate <i>Lycopersicon esculentum</i> Apio <i>Apium graveolens</i> Cebolla <i>Allium cepa</i> Lechuga <i>Lactuca sativa</i>	Nemátodos <i>Heterodera spp</i> <i>Meloidogyne spp</i> <i>Pratylenchus spp</i> Áfidos <i>Aphis spp</i> Mosca blanca <i>Bemisia tabaci</i> Trips <i>Thrips spp</i> Minador de la hoja <i>Liriomyza sp</i>	Foliar: 2-5 Semilleros y transplantes: Foliar: 2-5 (1,5-4 l/mz)	7 3
Café <i>Coffea arabica</i> Citricos <i>Citrus spp</i>	Nemátodos: <i>Meloidogyne spp</i> <i>Pratylenchus spp</i> Ácaros: <i>Phyllocoptruta oleivora</i> Thrips <i>Circaetrips citri</i>	Foliar: 2-5 (1,5-4 l/mz) Foliar: 2-5 (1,5-4 l/mz)	7 7
Banano - Plátano <i>Musa spp</i>	Nemátodos: <i>Radopholus similis</i> <i>Helicotylenchus spp</i> Picudo: <i>Cosmopolites sordidus</i>	Inmersión de rizomas en 0,5 l/376 l de agua, sumergir la parte basal durante 20 minutos. Aplicación directa de 5-10 ml por planta, dirigido a la base en frecuencia de 3-4 veces al año.	0
Piña <i>Ananas comosus</i>	Nemátodos: <i>Meloidogyne spp</i> <i>Pratylenchus spp</i> <i>Rotylenchulus reniformis</i>	Tratamiento pre-plantación: 8-12 l/ha (6-8,5 l/mz) Aplicación total al suelo una semana antes del trasplante. Aplicación foliar: 2-6 l/ha. (1,5-4,5 l/mz) Intervalos de aplicación de 4 semanas.	7

INTERVALO DE APLICACIÓN: Se puede utilizar en la siembra y después, cada 3 a 6 meses dependiendo de la incidencia de nemátodos. No aplique más de 4 veces al año.

INTERVALO Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: Utilizar cuando aparezcan los primeros indicios de ataque de la plaga. Aplicar de 7 a 14 días, según la presencia de la plaga, hasta completar 4 aplicaciones.

INTERVALO ENTRE LA ÚLTIMA APLICACIÓN Y LA COSECHA: Dependiendo del cultivo a tratar. Véase la tabla de intervalos según el cultivo.

INTERVALO DE REINGRESO AL ÁREA TRATADA: 24 horas después de la aplicación.

FITOTOXICIDAD: SUNXAMYL 24 SL no es fitotóxico a las dosis recomendadas en este panfleto.

COMPATIBILIDAD: El producto es compatible con la mayoría de los insecticidas y fungicidas actualmente en uso. No debe mezclarse con productos de reacción alcalina. No aplicar si la planta está en período de stress debido a bajas temperaturas, sequía o exceso de agua.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE:

Almacene fuera del alcance de los niños. Almacene y transporte el producto en lugares secos y aireados, lejos de alimentos, forrajes y medicinas.

Manténgalo en su empaque original, cerrado herméticamente, etiquetado y aparte de herbicidas.

NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACIÓN.
MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.



NO COMER, FUMAR O BEBER DURANTE EL MANEJO Y APLICACIÓN DE ESTE PRODUCTO.
BÁÑESE DESPUÉS DE TRABAJAR Y PÓNGASE ROPA LIMPIA.



SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN:

Se presenta inhibición de la colinesterasa, debilidad, visión borrosa, dolor de cabeza, náuseas, calambres abdominales, constricción de las pupilas, sudoración, pulso lento y temblor muscular.

PRIMEROS AUXILIOS:

INGESTIÓN: Provoque el vómito dando a beber suficiente agua tibia con sal.

INHALACIÓN: Retire el paciente a un lugar fresco, seco y aireado. Afloje las prendas de vestir y vigile la respiración.

CONTACTO CON LOS OJOS: Abra los párpados y lave los ojos con un flujo continuo de agua limpia por 15 minutos.

Consulte al médico.

CONTACTO CON LA PIEL: Quite las prendas de vestir y lave la parte afectada con suficiente agua y jabón. Durante 15 minutos.

NUNCA DE A BEBER NI INDUZCA EL VÓMITO A PERSONAS EN ESTADO DE INCONSCIENCIA.

ANTÍDOTO Y TRATAMIENTO MÉDICO: SULFATO DE ATROPINA.

Administre repetidas dosis de sulfato de Atropina, las dosis deben ser de 1,2 a 2 mg cada 10 minutos hasta que se consiga una total atropinización.

Se es necesario administrar respiración artificial u oxígeno, no utilice 2-PAM, no utilice morfina.

CENTROS NACIONALES DE INTOXICACIÓN:

INSTITUCIÓN

Centro Nacional de Intoxicaciones

PAÍS

Costa Rica:

TELÉFONO

2223-1028

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:

TÓXICO PARA PECES Y CRUSTÁCEOS



NO CONTAMINE RÍOS, LAGOS Y ESTANQUES CON ESTE PRODUCTO O CON ENVASES O EMPAQUES VACÍOS.

TÓXICO PARA ABEJAS

TÓXICO PARA EL GANADO

MANEJO DE ENVASES, EMPAQUES, Y REMANENTES: Aproveche el contenido completo del envase, cuando lo vacíe, lave y enjuague tres veces con agua limpia y agregue el resultado del enjuague a la mezcla ya preparada. Inutilice los envases vacíos, fórfalos. Si el país cuenta con un programa oficial de recolección y disposición de envases, entregue este al centro de recolección más cercano o deséchelo de acuerdo a las instrucciones del distribuidor del producto.

En caso de derrames o desechos de plaguicidas recolectarlos en un recipiente hermético y entregarlo al distribuidor o eliminarlo en un relleno sanitario autorizado por el Ministerio de Salud.

EL USO DE LOS ENVASES O EMPAQUES EN FORMA DIFERENTE PARA LO QUE FUERON DISEÑADOS,
PONE EN PELIGRO LA SALUD HUMANA Y EL AMBIENTE.

AVISO DE GARANTÍA: La compañía registrante garantiza el contenido original de la materia activa del producto y el uso recomendado en este panfleto, pero no responde en forma alguna por el mal uso que de él se haga. Debido a que está fuera de nuestro alcance el control sobre almacenamiento, manipulación y uso de este producto nos es imposible asumir responsabilidades por posibles daños que se puedan ocasionar debido a estos factores.

FABRICANTE Y FORMULADOR:

SUNDAT (S) PTE.LTD 26 Gul, Crescent, Singapore 629532
Tel.: (65) 6861-2460, Fax: (65) 6862-0287

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR: SERACSA

Tel.: (506) 2279-6994, Fax: (506) 2279-6409.
www.seracsa.com

País
Costa Rica

Nº de Registro
8702381

Fecha de Registro
05-05-2010