

HORMITOX 80 SP



FICHA TÉCNICA

Tipo de producto: Insecticida

Ingrediente activo: Carbaryl

Concentración y Formulación: 80% p/v (polvo soluble)

Modo de acción: Estomacal. Contacto.

Número de Registro MAG: 3737

Presentación: 100 gramos, 250 gramos, 500 gramos, 1 Kg y 20 Kgs.

Hormitox 80 SP es un Carbamato con actividad insecticida, de amplio espectro, que actúa por contacto e ingestión, ligeramente sistémico. Su eficacia inicial es rápida por lo cual ejerce una acción inmediata muy pronunciada; su actividad puede durar hasta 3 semanas. Produce carbamitación de la colinesterasa de los tejidos causando acumulación de acetilcolina en las uniones colinérgicas de las neuronas, efectos muscarínicos, y en las uniones mioneurales de los músculos y ganglios autónomos. El envenenamiento también altera la función del sistema nervioso central. Es eficaz contra huevos de algunas especies de insectos. .

Insectos a controlar:

Caligo (caligo memnon), Ceramidia (ceramidia butleri), Albardilla (sibine sp), Taladrador de la fruta (thecla basilides), Polilla (scrobipalposis solanibora), Perforador del fruto(helithis sp), Pulguilla negra (epitrix sp), perforador de la hoja (plutella xylostella, ascia monuste, trichoplusia, leptophobia aripa), Cicadélicos (empoasca), Vaquitas (diabrotica), Larvas del follaje (prodenia sp), Sogata (sogatodes oryzicala), Langosta (mocis spp), Larvas del follaje (spodoptera spp), Baba de culebra(prosapia sp), Salivazo (aenolamia spp), Cigarritas (draeculacephala spp).

Cultivos a proteger:

Arroz, brócoli, frijol, maíz, papa, piña, repollo, tomate, banano, pastos, hortalizas y ornamentales.

Dosis recomendada:

De 0.7 a 2.7 Kg por hectárea; 500 gramos en 200 litros de agua.

Periodo de aplicación cosecha:

7 a 14 días.

Compatibilidad/fitotoxicidad:

Es compatible con la mayoría de los plaguicidas de uso común, excepto con los alcalinos. No es fitotóxico a las dosis recomendadas.