



SERACSA 2.4 D 60%

FICHA TÉCNICA

Tipo de producto: Herbicida

Ingrediente activo: 2.4 D

Concentración y Formulación: 60 % p/v Solución Líquida

Modo de acción: Contacto

Número de Registro MAG: 2207

Presentación: 250 cc, 500 cc, 1 L, 3.5 L, 9.5 L y 19 L.

Flosil 25 SL es un herbicida selectivo post emergente absorbido por hojas y raíces, con muy limitada traslocación en el floema. Actúa por contacto, por lo que requiere una aplicación cuidadosa para lograr una buena cobertura de las malezas y asegurar los mejores resultados.

Malezas a controlar:

Tomatillo (*solanum americanum*), malva silvestre (*malva parviflora*), candado santo (*argemone mexicana*), diente de león (*taraxacum officinale*) rubarbo (*rumex crispus*), churrigata (*ipomoea spp*), chile de perro (*polygonum persicatiodes*), maravillita (*boerhavia erecta*), acedera amarilla (*oxalis comicularia*), lechuguilla (*zonchus oleraceus*), pelo de chino (*cyperus tenuis*), llantén (*plantago major*), cenizo (*chenopodium*), verdolaga (*portulaca oleracea*), canutillo (*commelina difusa*), bombillo (*calciolaria mexicana*), bledo (*amaranthus hybridus*), flor amarilla (*melampodium perfoliatum*), berenjena cimarrona (*solanum carolinense*), clavelito (*emilia sonchifolia*), farolillo chino (*playsalis angulata*), flor amarilla (*scelopocarpus divaricatum*), verbena (*verbena litoralis*), hierba mora (*solanum nigrum*), tiandum (*tiandum spp*), pimienta de agua (*polygonum sp*), rabanillo (*raphanus spp*), mielcilla (*galinzoga ciliata*), zanahoria silvestre (*daucus carota*), pega pega (*desmodium tortuosus*), clidenia (*clidenia spp*), caperonia (*capero spp*), nabillo (*brassica spp*), moriseco (*bidens pilosa*), artemisa (*artemisa spp*), santa lucía (*argeratum conyzoides*), olotillo (*acalypha spp*), azulejo (*centaurea spp*), frijolillo (*centrosema plumieri*), golondrina (*euphorbia spp*).

Cultivos a proteger:

Caña de azúcar, arroz, sorgo, maíz, pastos y potreros.

Dosis recomendada:

1-1.5 litros/ha. en pastos y caña de azúcar. De 1.5 a 2 litros/ ha en áreas no agrícolas. 1 litro en 200 litros de agua.

Periodo de aplicación cosecha:

6 días

Compatibilidad/fitotoxicidad:

Compatible con la mayoría de los herbicidas, excepto con los alcalinos. Es muy volátil por lo que deben evitarse las aplicaciones cerca de cultivos de hoja ancha.