



Ficha técnica

Majestic®

Majestic® es un biofertilizante de reserva energética de asimilación inmediata, que activa el metabolismo y regula la turgencia de las plantas.

Ventajas del uso de Majestic®:

- Aporta compuestos orgánicos energéticos de disponibilidad inmediata.
- Suple las deficiencias energéticas que enfrentan los cultivos bajo condiciones extremas, tanto en climas tropicales (altas temperaturas y alta luminosidad), como en tierras altas (baja luminosidad y bajas temperaturas).
- Contiene boro, elemento esencial en el transporte de azúcares y almidones desde las hojas hacia los frutos, lo que estimula la maduración y mejora la producción de flores y frutos.
- Está enriquecido con L-aminoácidos libres, componentes fundamentales de las proteínas, que ayudan a la planta a superar situaciones de estrés biótico y abiótico.
- Los ácidos fúlvicos incorporados optimizan el metabolismo de la planta y promueven una mayor absorción de nutrientes.

Cultivos:

Café (*Coffea arabica*), Cacao (*Theobroma cacao*), Aguacate (*Persea americana*), Maíz (*Zea mays*), Maní (*Arachis hypogaea*), Musaceas (*Musa* sp.) Tomate (*Lycopersicon esculentum*), melón (*Cucumis melo*), repollo (*Brassica oleracea* var. capitata), piña (*Ananas comosus*), papa (*Solanum tuberosum*), remolacha (*Beta vulgaris*), cebolla (*Allium cepa*), zanahoria (*Daucus carota*), brócoli (*Brassica oleracea* var capitata), Cítricos (*Citrus* sp.), Arroz (*Oryza sativa*), tubérculos, frutales y hortalizas en general.

Método de aplicación y dosis:

Aplice una dosis de 1-1.5 kg/200 L de agua o 4-6 kg/ha. Se recomienda aplicar Majestic durante el período vegetativo, desde el trasplante (o a los 20 días después de la siembra directa) hasta la madurez del cultivo, realizando aplicaciones cada 15 días; en cultivos perennes se aconseja efectuar tres aplicaciones a partir del trasplante (una por mes) y, durante la floración y fructificación, tres aplicaciones adicionales cada 15 días; además, en época seca puede utilizarse para reducir el estrés por sequía, mediante tres aplicaciones con intervalos de 15 días.

Composición química

	p/v
Boro (B)	2.00%
Polisacáridos	45.00%
L-Aminoácidos	5.00%

Presentación:

1 Litro
3.5 Litros
9.5 Litros
19 Litros
20 Litros
200 Litros