



FICHA TÉCNICA



COMPOSICIÓN QUÍMICA

P/V

Boro (B)	2.00%
Polisacáridos	45.00%
L-aminoácidos	5.00%
Inertes	48.00%

Presentación: 1 litro, 3.5 litros, 9.5 litros,
19 litros, 20 litros y 200 litros

Majestic es un biofertilizante de reserva energética de asimilación inmediata que activa el metabolismo y regula la turgencia de la planta.

VENTAJAS DEL USO DE MAJESTIC

- Disponibilidad inmediata de compuestos orgánicos energéticos.
- Suple las deficiencias de energía metabolizante que sufren los cultivos, tanto en condiciones de altas temperaturas y alta luminosidad (tierras tropicales), como en tierras altas, con poca luminosidad y bajas temperaturas.
- El boro que aporta, es indispensable en el transporte de azúcares y almidones de la hoja al fruto, lo que estimula la madurez y aumenta la producción de flores y frutos.
- Se ha enriquecido con L-aminoácidos libres que son los componentes fundamentales de las proteínas, y ayuda además a superar situaciones de estrés. Los ácidos fúlvicos incorporados ayudan al metabolismo de las plantas y promueven la absorción de los nutrientes.

Cultivos a aplicar: Café (*Coffea arabica*), Cacao (*Theobroma cacao*), Aguacate (*Persea americana*), Maíz (*Zea mays*), Maní (*Arachis hypogaea*), Musaceas (*Musa sp.*) Tomate (*Lycopersicum esculentum*), melón (*Cucumis melo*), repollo (*Brassica oleracea var. capitata*), piña (*Ananas comosus*), papa (*Solanum tuberosum*), remolacha (*Beta vulgaris*), cebolla (*Allium cepa*), zanahoria (*Daucus carota*), brócoli (*Brassica oleracea var capitata*), Citricos (*Citrus sp.*), Arroz (*Oryza sativa*), tubérculos, frutales y hortalizas en general.

Dosis: 1 a 1.5 Kg en 200 L de agua o 4 a 6 Kg/Ha.

Se recomienda usarlo durante el periodo vegetativo, comprendido desde el trasplante (o a los veinte días de nacido en siembra directa), hasta la madurez del cultivo. En ambos casos se debe hacer aplicaciones cada 15 días. En cultivos perennes, hacer 3 aplicaciones a partir del trasplante (una por mes); y durante la floración y fructificación, hacer 3 aplicaciones (una cada 15 días). Este abono se puede aplicar en la época seca, para evitar el estrés de la sequía, haciendo 3 aplicaciones con intervalos de 15 días.

Compatibilidad y fitotoxicidad:

No es fitotóxico a los cultivos indicados en las dosis sugeridas. Es incompatible con la mayoría de los plaguicidas y fertilizantes de uso común, sin embargo, se recomienda una prueba previa de compatibilidad.