

SERACSA METAMIDOFOS 60 SL

FICHA TÉCNICA

Tipo de producto: Insecticida, acaricida-organofosforado

Ingrediente activo: Metamidofos

Concentración y Formulación: 60 % p/v Solución líquida

Modo de acción: Contacto e ingestión

Número de Registro MAG: 3421

Presentación: 1 L.

SERACSA METAMIDOFOS 60 SL es un insecticida-acaricida organofosforado a base de metamidofos, el cual tiene acción de contacto, estomacal y sistémico. Inhibe las enzimas del grupo colinesterasas.

CULTIVO	PLAGA	DOSIS	ÉPOCA E INTERVALO DE APLICACIÓN
Algodón (<i>Gossypium hirsutum</i>)	Gusano bellotero (<i>Heliothis zea</i>), Mosca blanca (<i>Bemisia tabaci</i>), Gusano Soldado (<i>Spodoptera sp</i>), Araña Roja (<i>Tetranychus spp</i>), Gusano mayor de la hoja (<i>Alabama argillacea</i>), Áfidos o pulgones (<i>Aphis gossypii</i>), Trips (<i>Frankiniella sp</i>), Chinchas (<i>Dysercus sp</i>).	Use 1.5 a 2.0 litros/ha en 16-54 litros de agua si se usa equipo aéreo ó 135-675 litros de agua como preventivo a los primeros ataques de insectos y prosiga a intervalos de 7-10 días.	50 días
Melón (<i>Cucumis melo</i>) Pepino (<i>Cucumis sativa</i>)	Áfidos o pulgones (<i>Aphis gossypii</i>), Ácaros (<i>Tetranychus spp</i>), Perforador (<i>Diphanthia nitidalis</i>), Mosca Blanca (<i>Bemisia tabasi</i>), Barrenador del pepino (<i>Marcoronia nitidalis</i>), Cortadores (<i>Agrotis ipsilon</i>).	Use a razón de 0.75 a 1 litro/ ha. Estas plantas son susceptibles a insecticidas clorinados, por los que estos NO deben combinarse con este insecticida. Dentro de lo posible lo mejor es hacer las aplicaciones al atardecer para proteger a las abejas y otros insectos polinizadores. Realice aplicaciones con periodos de 7-10 días de acuerdo a los estados de plagas.	3 días para pepino 14 días para melón
Papa (<i>Solanum tuberosum</i>)	Polillas (<i>Scrobipalposis solanivora</i>), Áfidos (<i>Macrosiphum euphorbiae</i>), Pulgilla negra (<i>Epitrix spp</i>), Cigarritas (<i>Empoasca sp</i>), Vaquitas (<i>Diabrotica sp</i>), Minador (<i>Liriomyza</i>).	Use a razón de 0.75 a litro/ha ó sea 350-400ml por tanque de 200 litros de agua. Complemente el control usando semillas calificadas, inspeccionadas y de lotes sanos de la finca destinados para este fin. Aplique con intervalos de 7-10 días dependiendo del estado de las plagas y del criterio del agrónomo.	14 días

SERACSA METAMIDOFOS 60 SL



FICHA TÉCNICA

Intervalo de reingreso al área tratada:

Debe esperarse un mínimo de 48 horas para reingresar al área tratada. En caso necesario de hacerlo antes deberá usar el equipo de protección completo.

Compatibilidad/fitotoxicidad:

No es fitotóxico a los cultivos en las dosis aquí indicadas. Es compatible con los plaguicidas de uso normal en nuestro mercado como Mancozeb y Benomil. Es INCOMPATIBLE con los compuestos alcalinos tales como Caldo Bordelés y Sulfuro de Calcio. NO debe aplicarse junto a propaniles, para lo cual debe dejarse un periodo de al menos 8 días entre la aplicación de uno y otro.

Antídoto y tratamiento médico:

El antídoto específico es la ATROPINA en complemento con PAM o TOXOGONIN. Es muy importante el rápido vaciado del tubo digestivo y la limpieza de la piel contaminada, ya que estos compuestos se absorben rápidamente por la piel. En caso de ingestión se debe dejar vomitar, lavar el estómago con carbón activado y luego dar purgantes salinos.

Aviso de Garantía

La compañía fabricante así como el registran garantiza el contenido de este envase, siempre que se encuentre en su envase original bien cerrado y con el sello de garantía inalterado. Debido a que nos vemos imposibilitados de controlar aspectos importantes como transporte, almacenamiento y uso de este producto, no asumimos responsabilidad por posibles daños por ellos. Solo garantizamos el contenido inalterable del producto de acuerdo a lo estipulado en la etiqueta y en el panfleto.