



Composición química	p/p
Zinc (Zn)	18.00%
Boro (B)	4.50%
Azufre (S)	8.50%
Aminoácidos	5.00%
Polisacáridos	11.00%

Presentación:

1 kg
25 kg

Ficha técnica

Foliveex® Zinc-Boro Max

Foliveex® Zinc-Boro Max es un fertilizante foliar enriquecido con bioestimulantes para ser utilizado durante todo el ciclo del cultivo, comprendido desde el trasplante hasta la etapa productiva, con aplicaciones semanales, quincenales o mensuales según las necesidades nutricionales del cultivo. Son más continuas en cultivos de ciclo corto (anuales) o aplicaciones más distantes en cultivos perennes. Su uso se extiende desde la etapas vegetativa del cultivo, durante la floración e incluso la fructificación. Como bioestimulante es una excelente opción para superar el estrés y pérdida de turgencia ocasionado por periodos de sequía.

Recomendaciones de uso:

Cultivo	Dosis	Etapas	Frecuencia
Arroz	0.5-1 kg/ha	Prefloración	Cada 22 días
Banano, plátano	0.25-1 kg/ha	Todo el ciclo	Cada 8 días
Tomate, chile dulce	0.5-1 kg/ha	Prefloración, floración y cosecha	Cada 15 días
Repollo, brócoli, coliflor, papa, cebolla, zanahoria, remolacha, culantro, lechuga	0.5-1 kg/ha	Todo el ciclo	Cada 8 días
Café	0.5-1 kg/ha	Prefloración, floración y desarrollo de grano	Cada 30 días
Frutales, cítricos, aguacate, mango	0.5-1 kg/ha	Prefloración y floración	Cada 30 días
Piña	0.5-1 kg/ha	Todo el ciclo	Cada 12 días
Melón	0.5-1 kg/ha	Prefloración y floración	Cada 8 días
Ornamentales	0.5-1 kg/ha	Todo el ciclo	Cada 15 días

Forma de aplicación:

Se puede aplicar por vía foliar y fertirrigación en forma terrestre. En banano y plátano se aplica por vía aérea (drone, helicóptero y avión).